

คำแนะนำในการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ

ระหว่างเกิดการระบาดของโรคโควิด ๑๙

จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ COVID-๑๙ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินโครงการ กวาดล้างโรคโปลิโอของประเทศไทย ทั้งการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน การสอบสวนและควบคุมโรค การส่งตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโปลิโอทางห้องปฏิบัติการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการรณรงค์ให้วัคซีนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจาก กวาดล้างโรคโปลิโอเป็นภารกิจที่สำคัญของประเทศซึ่งไม่สามารถหยุดภารกิจได้ หากเกิดการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศไทย จะเกิดความเสียหายแก่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

๑. การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV และ IPV) ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยังคงมีความจำเป็นสำหรับเด็กเล็ก ให้ปฏิบัติตาม “คำแนะนำในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระหว่างเกิดการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)”

๒. การรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเดิม กำหนดการรณรงค์ฯ รอบที่ ๑ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และรอบที่ ๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จะหารือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรณรงค์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เป็นช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๓

ทั้งนี้ วัคซีน bOPV ที่ได้จัดส่งถึงโรงพยาบาลในพื้นที่แล้วนั้น ขอให้คลังวัคซีน เก็บวัคซีนดังกล่าวไว้ในช่องแช่แข็ง (อุณหภูมิระหว่าง -๑๕ ถึง -๒๕ องศาเซลเซียส โดยในเอกสาร กำกับยาระบุให้เก็บที่อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส)

๓. การเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) ยังคงเป็นมาตรการที่สำคัญของการกวาดล้างโรคโปลิโอ ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP ในทุกโรงพยาบาลตามปกติ ตามแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP (ตามเอกสารแนบ)

๔. การส่งตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วย AFP ตรวจหาเชื้อไวรัสโปลิโอ โดยสามารถส่งตัวอย่างได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง ๑๔ แห่งทั่วประเทศ

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

๒ เมษายน ๒๕๖๓