

แนวทางการให้วัคซีนป้องกัน

โรคโปลิโอเสริม

ในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด

พ.ศ. 2565



กองโรคติดต่อทั่วไป

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริม ในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด พ.ศ. 2565

การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ที่มีลักษณะการให้วัคซีนในวงกว้าง และทำพร้อมกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนแก่เด็กทุกคน ทั้งเด็กไทยและต่างชาติ ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงประวัติการได้รับ วัคซีนในอดีตมาก่อน โดยมีการสำรวจและนัดหมายเด็กมารับวัคซีน พร้อมทั้งการลงพื้นที่ให้บริการถึงหน้าประตูบ้าน เพื่อให้เด็กในพื้นที่เสี่ยงได้รับวัคซีนครอบคลุมทุกคน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันของเด็กในพื้นที่ให้สูงขึ้นเพียงพอ ต่อการป้องกันการเกิดโรคโปลิโอ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโปลิโอ พื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอต่ำ และพื้นที่มีเขตพรมแดนติดกับประเทศที่เกิดการระบาดโรคโปลิโอ

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปี 2562 ได้พบการระบาดของเชื้อ ไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (c-VDPV) Type 1 และ 2 ในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศเมียนมา ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งพื้นที่ที่มีการระบาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการรับ วัคซีนต่ำ ดังนั้นเพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันของเด็กในพื้นที่ให้สูงขึ้น เพียงพอต่อการป้องกันโรคโปลิโอและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสโปลิโอที่อาจกลับเข้ามาระบาดในประเทศไทยจึงจำเป็นต้อง มีการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง



แนวทางการดำเนินงาน

1. พื้นที่เสี่ยงในการณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริม 8 จังหวัด ดังนี้

1.1 พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี)

1.2 พื้นที่อำเภอชายแดนไทย - เมียนมาใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี

2. ประชากรเป้าหมาย : เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ทุกชาย

3. กำหนดการดำเนินการรณรงค์

3.1 พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หมายเหตุ
1) แจ้างพื้นที่และส่งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมทั้ง 4 จังหวัด	เดือนมกราคม 2565	
2) วางแผนปฏิบัติงาน (Micro-planning)	เดือนมกราคม – กันยายน 2565	
3) สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565	
4) จัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP)	เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565	จัดส่งวัคซีน 1 ครั้ง
5) รณรงค์ รอบที่ 1	เดือนสิงหาคม 2565	
6) รายงานผลการรณรงค์ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากรณรงค์รอบที่ 1 <i>รายละเอียดตามหน้าที่ 8</i>	เดือนสิงหาคม – กันยายน 2565	
7) รณรงค์ รอบที่ 2	เดือนกันยายน 2565	
8) รายงานผลการรณรงค์ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากรณรงค์รอบที่ 2 <i>รายละเอียดตามหน้าที่ 8</i>	เดือนกันยายน – ตุลาคม 2565	
9) สคร. รวบรวมผลการรณรงค์ตามตาราง รง. FP 7 และ รง. FP 8 พร้อมแผนปฏิบัติงาน (Micro-planning) มายังกลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป	เดือนกันยายน – ตุลาคม 2565	

หมายเหตุ : 1. เนื่องจากการรณรงค์ดังกล่าวในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ปี 2565 มีการจัดส่งวัคซีนเพียง 1 ครั้ง เพื่อใช้สำหรับในการรณรงค์ทั้ง 2 รอบ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบคลังวัคซีนในโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บวัคซีน

2. กำหนดการรณรงค์อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่

3.2 พื้นที่อำเภอชายแดนไทย - เมียนมาใน 4 จังหวัด

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หมายเหตุ
1) แจ้างพื้นที่และส่งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมทั้ง 4 จังหวัด	เดือนกุมภาพันธ์ 2565	
2) วางแผนปฏิบัติงาน (Micro-planning)	เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2565	
3) สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565	
4) จัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP)	เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2565	จัดส่งวัคซีน 1 ครั้ง
5) รณรงค์ รอบที่ 1	เดือนพฤศจิกายน 2565	
6) รายงานผลการรณรงค์ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากรณรงค์รอบที่ 1 <i>รายละเอียดตามหน้าที่ 8</i>	เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565	

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หมายเหตุ
7) รณรงค์ รอบที่ 2	เดือนธันวาคม 2565	
8) รายงานผลการรณรงค์ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากรณรงค์รอบที่ 2 <i>รายละเอียดตามหน้าที่ 8</i>	เดือนธันวาคม – มกราคม 2565	
9) สคร. รวบรวมผลการรณรงค์ตามตาราง รง. FP 7 และ รง.FP 8 พร้อมแผนปฏิบัติงาน (Micro-planning) มายังกลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป	เดือนธันวาคม – มกราคม 2565	

หมายเหตุ : 1. เนื่องจากการรณรงค์ดังกล่าวในพื้นที่อำเภอชายแดนไทย - เมียนมาใน 4 จังหวัด ปี 2565 มีการจัดส่งวัคซีนเพียง 1 ครั้ง เพื่อใช้สำหรับในการรณรงค์ทั้ง 2 รอบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบคลังวัคซีนในโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บวัคซีน

2. กำหนดการรณรงค์อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่

4. ตัวชี้วัดการรณรงค์

ระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในช่วงการรณรงค์ฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 รายตำบล

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจากจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมคือ เด็กในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ซึ่งเป็นเด็กที่มักจะได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ หรือ พื้นที่ติดกับประเทศที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ และพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโปลิโอกลับเข้ามาระบาดในประเทศไทย “ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อทราบและให้ดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กที่เป็นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายหรือแรงงานต่างชาติที่อาจหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่”

- กลุ่มเป้าหมายเด็กไทย อายุต่ำกว่า 5 ปี ให้ดำเนินการสำรวจจริงในพื้นที่ หรือ รวบรวมจากฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ ที่แต่ละสถานบริการพิจารณาเห็นว่าครบถ้วนมากที่สุด เช่น รบ.1ก/3 บัญชีกลุ่มอายุ ทะเบียนราษฎร จปฐ. ทะเบียนรายชื่อเด็กในศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น

- สำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ดำเนินการสำรวจจริงในพื้นที่ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลประชากรกลุ่มนี้ ทั้งภาครัฐ เช่น สำนักงานแรงงานจังหวัด องค์การพัฒนาชุมชน และองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ที่ดูแลช่วยเหลือต่างชาติในพื้นที่และในศูนย์พักพิงชั่วคราว รวบรวมตรวจสอบและติดตามเด็กเป้าหมายในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่พื้นที่หรือหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด

2. การแจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงตาม **รง. FP1** และให้หน่วยบริการจัดทำจำนวนเด็กที่สำรวจได้ และแจ้งจำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้ตาม **รง. FP2** ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายรวบรวมและจัดทำ **รง. FP3** ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม และจัดทำ **รง. FP4** แจ้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนเป้าหมายและจำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้ แจ้งไปยังกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ทราบตามลำดับต่อไป

3. การเบิกจ่ายและการคาดการณ์การจำนวนวัคซีนที่ใช้ในการให้วัคซีนโปลิโอเสริม

3.1 ชนิดวัคซีน

วัคซีนที่ใช้ในการรณรงค์ครั้งนี้ คือ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) ขนาดบรรจุ 20 โดส/ขวด

3.2 การคาดการณ์การจำนวนวัคซีนที่ใช้ในการให้บริการ

วัคซีน OPV สำหรับรณรงค์

$$\text{จำนวนวัคซีนที่ขอเบิก (ขวด)} = \frac{\text{จำนวนเป้าหมาย} \times \text{ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน}}{\text{ขนาดบรรจุ}}$$

โดย จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

อัตราการสูญเสียวัคซีน OPV = ร้อยละ 10 ; ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน = 1.11

ขนาดบรรจุ = 20 โดส ต่อ ขวด

$$\text{ดังนั้น จำนวนวัคซีน OPV ที่ขอเบิก (ขวด)} = \frac{\text{จำนวนกลุ่มเป้าหมาย} \times 1.11}{20}$$

$$\begin{aligned} \text{ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน 30 คน ต้องใช้วัคซีนกี่ขวด} \\ &= \frac{30 \times 1.11}{20} \\ &= 1.66 \text{ ขวด (พิเศษให้เป็น 2 ขวด)} \end{aligned}$$

ดังนั้น จำนวนวัคซีน OPV ที่ต้องการใช้ คือ 2 ขวด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมยอดประชากรเด็กกลุ่มเป้าหมาย แยกเด็กไทยและเด็กต่างชาติรวมเป็นรายอำเภอ (CUP) และจำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้ในการรณรงค์ โดยรายงานมายังกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต เพื่อใช้ในการจัดสรรปริมาณวัคซีนต่อไป

3.3 การจัดส่งวัคซีน

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จะดำเนินการ “จัดส่งวัคซีนสำหรับการรณรงค์ฯ ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นราย CUP เพียง 1 ครั้ง” เพื่อใช้สำหรับในการรณรงค์ทั้ง 2 รอบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบประสานเภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน เพื่อเตรียมพื้นที่จัดเก็บวัคซีนและการตรวจรับวัคซีน รวมทั้งการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัคซีนแยกออกจากวัคซีน Routine

4. จัดทำแผนปฏิบัติการให้บริการในวันให้วัคซีนโปลิโอเสริม (Micro-planning)

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการในการณรงค์ (Micro-planning) แบบมีรายละเอียด

1) การณรงค์แบบกำหนดจุดให้บริการในลักษณะการตั้งหน่วยบริการ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่นัดหมายให้ชัดเจน
2) การณรงค์แบบออกให้บริการถึงหน้าประตูบ้าน (door-to-door) กำหนดทีมพื้นที่ขอบเขตรับผิดชอบของแต่ละทีม ตลอดจนกำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครภาคประชาชน และเครือข่ายไม่แสวงหากำไรในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กกลุ่มเป้าหมายทุกคนจะได้รับวัคซีนในช่วงรณรงค์ (ตามแบบฟอร์ม หน้า 10)

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม และตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะโรคระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรค

5. การประชาสัมพันธ์

เน้นประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริมผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หอกระจายข่าว อสม. สื่อวิทยุภายในท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร (NGO) สโมสรโรตารีสากล และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ให้มากที่สุด

6. ปฏิบัติการให้วัคซีนในวันรณรงค์ ตามที่วางแผนไว้

เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้วัคซีนตามแผนปฏิบัติการในการรณรงค์ช่วงเช้า อาจจะให้บริการในลักษณะการตั้งหน่วยบริการตามรายชื่อเด็กในแบบสำรวจกลุ่มเป้าหมาย (รจ. FP1) ที่สำรวจไว้ และหลังการให้บริการในวันที่ให้วัคซีนโปลิโอเสริมเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะต้องออกไปติดตามให้วัคซีนแก่เด็กถึงประตูบ้าน (door-to-door) ในช่วงบ่าย โดยพยายามให้บริการให้ได้ความครอบคลุมมากที่สุด และดำเนินเก็บตกเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนภายใน 1-2 วัน หลังวันรณรงค์

ทั้งนี้ การดำเนินการให้บริการวัคซีนช่วงรณรงค์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้เจ้าหน้าที่มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารจัดการช่วงเวลาการให้บริการ จำนวนผู้มารับบริการ การจัดสถานที่ เพื่อลดความแออัดของการมารวมตัวของประชากรจำนวนมาก โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม และการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ (กรณีเด็กที่ใส่หน้ากากอนามัยได้) และผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมไปถึงผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและได้รับความปลอดภัย

7. การบริหารจัดการวัคซีนรณรงค์

7.1 การบริหารจัดการวัคซีนรณรงค์ภายในจังหวัด

ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารจัดการวัคซีนภายในจังหวัด โดยเกลี่ยวัคซีนจากพื้นที่ที่มีวัคซีนเกินกว่าจำนวนเป้าหมายให้กับพื้นที่ที่มีวัคซีนไม่เพียงพอ เพื่อให้ใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.2 การบริหารจัดการวัคซีนรณรงค์ระหว่างจังหวัด

สำหรับจังหวัดที่ได้มีการบริหารจัดการเกลี่ยวัคซีนภายในจังหวัด แต่วัคซีนสำหรับการรณรงค์ยังไม่เพียงพอ ขอความร่วมมือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคประสานจัดการวัคซีนจังหวัดในเขตรับผิดชอบกรณีที่มีความจำเป็นต้องเกลี่ยวัคซีนข้ามจังหวัด

8. การรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน

รายงานจำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีนลงใน แบบ รง. FP5, รง. FP6, รง. FP7 และ รง. FP8 ส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการให้วัคซีนเสริมแต่ละรอบ ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคจะรวบรวมส่งต่อมายังกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคตามลำดับ

9. การบันทึกข้อมูลการรับวัคซีน

บันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) พร้อมทั้งทำการบันทึกในโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล 43 แฟ้ม) โดยใช้รหัสวัคซีน 089 ชื่อวัคซีน OPVC (โอพีวีซี) รหัส ICD-10-TM Z24.0

คำแนะนำการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในพื้นที่เสี่ยง ระหว่างเกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอของประเทศไทย ทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง เนื่องด้วยการดำเนินงานกวาดล้างโรคโปลิโอยังเป็นภารกิจที่สำคัญของประเทศซึ่งไม่สามารถหยุดได้ หากเกิดการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศจะเกิดความเสียหายแก่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในพื้นที่เสี่ยงในระหว่างเกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พื้นที่ควรมีการเตรียมการและการบริการจัดการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของโรค ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อช่วงในการรณรงค์

ข้อแนะนำ

1. เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบวันหมดอายุของวัคซีนสำหรับให้บริการ และจัดเตรียมวัคซีนและอุปกรณ์ให้เพียงพอ
2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้วัคซีนตามแผนที่กำหนดจนครบเป้าหมายทุกคน โดยจัดสถานที่และจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม ดังนี้
 - 2.1 การบริการให้วัคซีนเสริมในรูปแบบตั้งหน่วยบริการ สถานบริการสามารถบริหารจัดการช่วงเวลาการให้บริการ กำหนดจำนวนผู้มารับบริการต่อช่วงเวลา เพื่อความรวดเร็วและลดการแออัด
 - 2.2 การจัดสถานที่ และจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม
 - การทำความสะอาดสถานที่ก่อนการให้บริการโดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
 - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า
 - การป้องกันตนเองด้วยวิธี Droplet Transmission Precaution
 - การเว้นระยะห่างระหว่างผู้มารับวัคซีนให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
 - 2.3 ผู้ให้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลตลอดการให้บริการ และล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการ
 - 2.4 เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้วัคซีนแก่เด็กเป้าหมาย ขนาดโดสละ 0.1- 0.5. มล. (2-3 หยดแล้วแต่บริษัทผู้ผลิต) การให้วัคซีนควรต้องระวังมิให้ปากขวดสัมผัสกับปากเด็ก เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อ จากเด็กคนหนึ่งไปสู่เด็กอีกคนหนึ่งได้ และเมื่อรับบริการเสร็จแล้ว ให้แนะนำผู้รับวัคซีน กลับบ้านทันที
- ทั้งนี้ รวมทั้งหน่วยบริการที่จัดบริการแบบเคลื่อนที่ให้ปฏิบัติในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
3. กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบางพื้นที่ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจัดการรณรงค์ได้ตามที่กำหนด สามารถพิจารณาเลื่อนการรณรงค์ออกไปและเร่งจัดการรณรงค์โดยเร็วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ก่อนสิ้นอายุการใช้งานของวัคซีน

แบบบันทึกการรายงาน

1. แบบบัญชีรายชื่อเด็กกลุ่มเป้าหมาย (รง. FP1)

แบบบันทึกที่เจ้าหน้าที่ ใช้ระหว่างการสำรวจเป้าหมายเพื่อบันทึกรายละเอียดของเด็กในหมู่บ้าน/ชุมชนที่รับผิดชอบ ได้แก่ ชื่อ สกุล ที่อยู่ วันที่ได้รับวัคซีนโปลิโอ ทั้งตามกำหนดปกติและการให้วัคซีนโปลิโอเสริม

สำหรับเด็กที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจ หากพบในวันให้วัคซีนโปลิโอเสริมทั้ง 2 ครั้ง ให้กรอกรายชื่อเด็กรายนั้นเพิ่มเติมท้ายแบบบันทึกนี้

2. แบบฟอร์มแจ้งพื้นที่และจำนวนเป้าหมายการให้วัคซีนโปลิโอเสริม (รง. FP2, รง. FP3, รง. FP4)

แบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้แจ้งจำนวนเด็กทั้งหมดที่สำรวจพบ วันที่ให้วัคซีนโปลิโอเสริม จำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้ เพื่อใช้วางแผนในการให้วัคซีนโปลิโอเสริมต่อไป

- หน่วยบริการ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / ศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่ง รง. FP2 ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่าย

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่าย ส่ง รง. FP3 ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่ง รง. FP4 ไปยัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ส่ง รง. FP4 ไปยัง กลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vaccine.ddc@gmail.com ติดต่อ 02 590 3196 ต่อ 115

3. แบบฟอร์มรายงานผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กเป้าหมายพิเศษ (รง. FP5)

สถานบริการแต่ละแห่งจัดทำแบบรายงานผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริมหลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละรอบ ส่งไปที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่าย ให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันให้วัคซีนโปลิโอเสริม

4. แบบรายงานผลงานการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (รง. FP6)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่าย เป็นผู้จัดทำ รง. FP6 โดยรวบรวมจาก รง. FP5 ที่หน่วยบริการรายงานผลมา และส่ง รง. FP6 ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

5. แบบรายงานผลงานการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (รง. FP7)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดทำ รง. FP7 ผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริมของแต่ละตำบลในอำเภอของจังหวัดนั้นๆ โดยรวบรวมจาก รง. FP6

6. แบบรายงานผลงานการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (รง. FP8)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดทำ รง. FP8 ผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริมของทั้งจังหวัด โดยรวบรวมจาก รง. FP7 ซึ่งสรุปรายงานความครอบคลุมเป็นรายตำบล และรวบรวมรายงานจำนวนตำบลจำแนกตามระดับความครอบคลุม สรุปข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริมโดยจำแนกเป็น เด็กไทย และเด็กต่างชาติ และจำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ในการให้วัคซีนโปลิโอเสริม

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล รง. FP7 และ รง. FP8 โปรดส่งรายงาน รง. FP7 และ รง. FP8 ไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภายใน 1 เดือนหลังการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแต่ละรอบ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ส่งมาส่งต่อมายัง กลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ต่อไป หรือ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vaccine.ddc@gmail.com ติดต่อ 02 590 3196 ต่อ 115

ผู้ประสานงานโครงการ : กลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป

1. นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย (ผู้จัดการโครงการฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 1671 5239
อีเมล chaninan33@yahoo.com
2. แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรกร (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 68946633
อีเมล Piyada.angs@gmail.com
3. นายวิรัตน์ พลเลิศ (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 08 1615 4269
อีเมล bigdiary2002@yahoo.com
4. นางสาวจิราวรรณ เวฬุวนารักษ์ (การบริหารโครงการฯ)
โทรศัพท์ 0 2590 3196 ถึง 9 โทรศัพท์มือถือ 06 5616 1566
อีเมล jirawan_1313@hotmail.com

การกระจายวัคซีน: กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์

1. เภสัชกรอภิชัย พจน์เลิศอรุณ
โทรศัพท์ 0 2590 3222 โทรศัพท์มือถือ 08 1553 7774
อีเมล Idol_99_2000@yahoo.com
2. เภสัชกรชัตติยะ อุดมอ่าง (การจัดส่งวัคซีน)
โทรศัพท์ 0 2590 3222 โทรศัพท์มือถือ 08 0291 3312
อีเมล kub-2007@hotmail.com
3. เภสัชกรหญิงปิยะนาถ เชื้อนาค (ความรู้และการใช้วัคซีน OPV)
โทรศัพท์ 0 2590 3222 โทรศัพท์มือถือ 08 4761 7449
อีเมล indee_indy@msn.com

แผนปฏิบัติการให้บริการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (Micro-planning)

หน่วยบริการ.....

อำเภอ..... จังหวัด

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ
1.เตรียมการดำเนินการ			
	- กำหนดเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ		
	- สำนวจำนวนกลุ่มเป้าหมาย		
	- ประชาสัมพันธ์		
2.ดำเนินการรณรงค์ รอบที่ 1			
	- ประชุมเตรียมงานและมอบหมายหน้าที่		
	- ตั้งจุดบริการ		
	● จุดที่ 1		
	● จุดที่ 2		
	- ออกหน่วยบริการถึงหน้าประตู		
	● ทีม 1		
	● ทีม 2		
3. หลังการรณรงค์รอบที่ 1			
	- สรุปรายงานผลการรณรงค์ รอบที่ 1		
	- สสจ. / สคร. ลงพื้นที่ประเมินความครอบคลุมการรับวัคซีนเด็กในพื้นที่ หลังการรณรงค์ฯ		
4. ดำเนินการรณรงค์ รอบที่ 2			
	- ประชุมเตรียมงานและมอบหมายหน้าที่		
	- ตั้งจุดบริการ		
	● จุดที่ 1		
	● จุดที่ 2		
	- ออกหน่วยบริการถึงหน้าประตู		
	● ทีม 1		
	● ทีม 2		
5. หลังการรณรงค์รอบที่ 2			
	- สรุปรายงานผลการรณรงค์ รอบที่ 2		
	- สสจ. / สคร. ลงพื้นที่ประเมินความครอบคลุมการรับวัคซีนเด็กในพื้นที่ หลังการรณรงค์ฯ		

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการให้บริการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (Micro-planning) ดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งผู้รับผิดชอบสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ตามความเหมาะสม

รณ. FP 1

☐ เด็กไทย อายุ ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน คน

☐ เด็กต่างชาติ อายุ ต่ำกว่า 15 ปี จำนวน คน

หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ชื่อผู้สำรวจ สำรวจวันที่/...../.....

[illegible]

หมายเหตุ : เด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนชั้นอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็ก ให้นับเป็นเด็กในความรับผิดชอบของพื้นที่ที่โรงเรียนหรือศูนย์ฯ ตั้งอยู่

ระดับหน่วยบริการ

รง. FP 2

แบบฟอร์มแจ้งพื้นที่และจำนวนเป้าหมายการให้วัคซีนโปลิโอเสริม

รพ.สต./หน่วยบริการ โรงพยาบาลแม่ข่าย

รอบที่ 1 วันที่/...../..... รอบที่ 2 วันที่/...../.....

ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน	จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย (คน)			จำนวนวัคซีนที่ต้องการ (ขวด : 20 doses)
	เด็กไทย	เด็กต่างชาติ	รวม	
รวม				

สรุป จำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้ ขวด

จำนวนวัคซีนคงเหลือจากรอบที่ผ่านมาใน รพ.สต. ขวด

จำนวนวัคซีนขอเบิกเพิ่ม ขวด

ระดับอำเภอ

รง. FP 3

แบบฟอร์มแจ้งพื้นที่และจำนวนเป้าหมายการให้วัคซีนโปลิโอเสริม

สสอ / โรงพยาบาลแม่ข่าย

รอบที่ 1 วันที่/...../..... รอบที่ 2 วันที่/...../.....

รพ.สต./หน่วยบริการ/ ศูนย์พักพิงชั่วคราว	จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย (คน)			จำนวนวัคซีนที่ต้องการ (ขวด : 20 doses)
	เด็กไทย	เด็กต่างชาติ	รวม	
รวม				

สรุป จำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้ ขวด
 จำนวนวัคซีนคงเหลือจากรอบที่ผ่านมาในคลังและ รพ.สต. ขวด
 จำนวนวัคซีนขอเบิกเพิ่ม ขวด

ຮຸ່ງ. FP 4

จังหวัด.....

รอบที่ 1 วันที่/...../..... รอบที่ 2 วันที่/...../.....

โรงพยาบาล / ศูนย์พักพิงชั่วคราว	จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย (คน)			จำนวนวัคซีน (ขวด : 20 doses)		
	เด็กไทย	เด็กต่างชาติ	รวม	ที่ต้องการใช้	คงเหลือจาก รอบที่ผ่านมา	ขอเบิกเพิ่ม
รวม						

แบบฟอร์มรายงานผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กเป้าหมายพิเศษ

จังหวัด.....

รายงานการให้วัคซีนโปลิโอเสริม รอบที่ 1 วันที่/...../.....

รอบที่ 2 วันที่/...../.....

พื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวนตำบล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รพ.สต. / PCU / รพ. อำเภอ

สนง. สสอ. จังหวัด(กรณีเป็นจุดหยอดวัคซีน)

สนง. สสจ.(กรณีเป็นจุดหยอดวัคซีน)

จำนวนเด็กใน พื้นที่ที่ รับผิดชอบที่ สำรวจไว้ (ตาม รง.FP1)	จำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีนโปลิโอ					จำนวน วัคซีนที่ เปิดใช้ (ขวด)
	เด็กในจังหวัด			เด็กนอก พื้นที่ที่ได้รับ วัคซีน	เด็ก นอก จังหวัด	
	เด็กในพื้นที่					
	ได้รับในพื้นที่	ได้รับจาก ที่อื่น	*ความ ครอบคลุม (%)			
เด็กไทย						
เด็กต่างชาติ						
รวม						

หมายเหตุ

1. จำนวนเด็กที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจ แต่เป็นเด็กที่เกิดใหม่หรือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ คน
2. จำนวนเด็กที่รายชื่ออยู่ในรายชื่อในการสำรวจแต่ไม่พบระหว่างช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริม คน
 - 2.1 ย้ายออก หรือ ตาย คน
 - 2.2 ไม่ทราบว่าเด็กอยู่ที่ไหน คน

ระดับอำเภอ

รจ. FP 6

แบบรายงานผลงานการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

☐ เด็กไทย

☐ เด็กต่างชาติ

การให้วัคซีนโปลิโอเสริม ☐ ครั้งที่ 1 วันที่/...../.....

☐ ครั้งที่ 2 วันที่/...../.....

อำเภอ จังหวัด

ตำบล	รพ.สต./ สอ.	จำนวนเด็กในพื้นที่ที่ รับผิดชอบที่สำรวจไว้ (ตาม FP.๑)	จำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีนโปลิโอ						จำนวนเด็กที่ เกิดใหม่หรือ ย้ายเข้ามาอยู่ ใหม่หลังการ สำรวจ	จำนวนเด็กที่ไม่พบ ในช่วงการให้วัคซีน โปลิโอเสริม		จำนวน วัคซีนที่ เปิดใช้ (ขวด)	จำนวน วัคซีน คงเหลือ (ขวด)
			เด็กในจังหวัด				เด็ก นอกจังหวัด	** ผลการ ปฏิบัติงานให้ วัคซีนช่วงการให้ วัคซีนโปลิโอเสริม					
			เด็กในพื้นที่			เด็กนอก พื้นที่							
			ได้รับใน พื้นที่	ได้รับจาก ที่อื่น	*ความครอบคลุม (%)					ย้ายออก หรือตาย	ไม่ทราบ ว่าเด็ก อยู่ที่ใด		
		(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		
1	1												
	2												
	3												
	รวม												
2	1												
	2												
	3												
	รวม												
รวมทั้งอำเภอ													

หมายเหตุ 1. * ครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโปลิโอช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริม (%) = $\frac{\text{จำนวนเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนโปลิโอช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริมทั้งหมด}}{\text{จำนวนเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด}} \times 100$

จำนวนเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด

1.1 จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนโปลิโอช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริมทั้งหมด = (2) + (3) คน

1.2 จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด = (1) + (6) - (7) คน

2. ** ผลการปฏิบัติงานให้วัคซีนโปลิโอช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริม = (2) + (4) + (5)

ระดับจังหวัด

รง. FP 7

แบบรายงานผลงานการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

☐ เด็กไทย

☐ เด็กต่างชาติ

การให้วัคซีนโปลิโอเสริม ☐ ครั้งที่ 1 วันที่/...../.....

☐ ครั้งที่ 2 วันที่/...../.....

จังหวัด

อำเภอ	ตำบล	รพ.สต./สอ.	จำนวนเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่สำรวจไว้ (ตาม FP.๑)	จำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีนโปลิโอ					จำนวนเด็กที่เกิดใหม่หรือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หลังการสำรวจ	จำนวนเด็กที่ไม่พบในช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริม		จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (ขวด)	จำนวนวัคซีนคงเหลือ (ขวด)	
				เด็กในจังหวัด			เด็กนอกจังหวัด	** ผลการปฏิบัติงานให้วัคซีนช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริม		ย้ายออกหรือตาย	ไม่ทราบว่าเด็กอยู่ที่ใด			
				เด็กในพื้นที่										
				ได้รับในพื้นที่	ได้รับจากที่อื่น	*ความครอบคลุม (%)								
			(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		
1	1	1												
		2												
		รวม												
2	2	1												
		2												
		รวม												
	รวมทั้งอำเภอ													
รวมทั้งจังหวัด														

หมายเหตุ 1. * ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโปลิโอช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริม (%) = $\frac{\text{จำนวนเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนโปลิโอช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริมทั้งหมด}}{\text{จำนวนเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด}} \times 100$

1.1 จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนโปลิโอช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริมทั้งหมด = (2) + (3) คน

1.2 จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด = (1) + (6) - (7) คน

2. ** ผลการปฏิบัติงานให้วัคซีนโปลิโอช่วงการให้วัคซีนโปลิโอเสริม = (2) + (4) + (5)

ระดับจังหวัด

รง. FP 8

แบบรายงานจำนวนตำบล ในเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
จำแนกตามระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโปลิโอเสริม
จังหวัด

☐ ครั้งที่ 1/...../..... ☐ ครั้งที่ 2/...../.....

กลุ่มเป้าหมายที่ให้วัคซีนเสริม เด็กไทย ทั้งหมด ตำบล

กลุ่มเป้าหมายที่ให้วัคซีนเสริม เด็กต่างชาติ ทั้งหมด ตำบล

ลักษณะประชากร เป้าหมาย	จำนวนตำบลจำแนกตามระดับความครอบคลุม					
	ร้อยละ <50	ร้อยละ 50-59	ร้อยละ 60-69	ร้อยละ 70-79	ร้อยละ 80-89	ร้อยละ 90-100
เด็กไทย						
เด็กต่างชาติ						

สรุปผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริม จำแนกตามลักษณะประชากรเป้าหมาย

ผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริม	เด็กไทย	เด็กต่างชาติ
1. จำนวนเด็กที่ยอดวัคซีนโปลิโอได้ทั้งหมด รวมเด็กในจังหวัด นอกจังหวัด (จากหมายเหตุ ข้อ 2 ใน รง. FP7)		
2. จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด (จากหมายเหตุ ข้อ 1.1 ใน รง. FP7)		
3. จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด ได้รับวัคซีนโปลิโอ (จากหมายเหตุ ข้อ 1.2 ใน รง. FP7)		

จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ทั้งหมดขวด

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินรณรงค์

เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ <https://bit.ly/3IDvci7> หรือ ผ่านรหัส QR ด้านล่าง โดยประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

1. แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด พ.ศ. 2565
2. ตัวโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง พ.ศ. 2563-2567
3. แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการให้บริการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (Micro-planning)
4. แบบฟอร์ม แบบบัญชีรายชื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโปลิโอเสริม (รง. FP1)
5. แบบฟอร์มแจ้งพื้นที่และจำนวนเป้าหมายการให้วัคซีนโปลิโอเสริม (รง. FP2, รง. FP3, รง. FP4)
6. แบบฟอร์ม รายงานผลการให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กเป้าหมายพิเศษ (รง. FP5, รง. FP6 ,รง. FP7)
7. แบบรายงานจำนวนตำบล ในเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษจำแนกตามระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโปลิโอเสริม (รง. FP8)
8. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



