

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่า ข้อมูลระบาดวิทยา และไวรัสวิทยาในปัจจุบัน ควรวิเคราะห์และอธิบายผลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ แตกต่างไป เนื่องจากประเทศสมาชิก มีมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยเช่นกัน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์อยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ แม้ว่าจะมีการทดสอบหาเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องและมีรายงานการตรวจพบไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้นในบางประเทศ ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าฤดูกาล แม้ว่าจะมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ ชนิด B ในบางประเทศ ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในระดับฤดูกาล ในประเทศแอฟริกาใต้และอเมริกาใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B ประปรายในบางประเทศที่มีการรายงาน สถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ซึ่งอาจเกิดจากโรค COVID-19 ลดลง ในประเทศที่มีการรายงาน ในเขตร้อนอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศที่มีการรายงาน แอฟริกาเขตร้อน มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในบางประเทศ ในแอฟริกาตะวันตก ประเทศในเอเชียใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) อย่างต่อเนื่อง ในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และชนิด B ในระดับที่ใกล้เคียงกัน องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีความมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

องค์การอนามัยโลก สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 เพื่อสร้างรูปแบบการรายงานในระดับภูมิภาค และระดับโลก

- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** ในภาพรวม สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล ประเทศแถบอเมริกาเหนือ พบตัวบ่งชี้สถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงร้อยละของผลบวกของโรคไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) อยู่ในระดับที่ต่ำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละของการเสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรค COVID-19 สูงกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรคปอดบวม และอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ที่ประมาณการจากข้อมูลในอดีต


- ในยุโรป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่มักรายงานอยู่ในระดับระหว่างฤดูกาล แม้ว่าจะมีการรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A และชนิด B ในประเทศที่มีการรายงาน พบรายงานการเฝ้าระวังกลุ่มอาการ Syndromic Surveillance) ในหลายประเทศ ตัวบ่งชี้อาการป่วยโรคทางเดินหายใจ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในบางประเทศที่มีการรายงานซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีรายงานสถานการณ์ของเชื้อ Rhinovirus ในบางประเทศ ที่มีการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่น ๆ ประมาณการการเสียชีวิตโดยรวม จากเครือข่าย EuroMOMO พบว่าอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในบางประเทศ และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
- ในเอเชียกลาง ไม่มีการตรวจพบเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงเวลาการรายงานนี้
- ในแอฟริกาเหนือ ไม่มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงนี้
- ในเอเชียตะวันตก โดยรวมสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับระหว่างฤดูกาล และสถานการณ์ของผู้ป่วย ILI อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศซาอุดีอาระเบีย มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง และมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในระดับต่ำ
- ในเอเชียตะวันออก ตัวชี้วัดอาการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับระหว่างฤดูกาล ในประเทศที่มีการรายงาน สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ มีการรายงานผู้ป่วย ILI อย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับโรคไข้หวัดใหญ่ 3 ฤดูที่ก่อนหน้านี้ โดยมีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง อัตราผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็ตาม
- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต้** ในประเทศแถบแคริบเบียนและอเมริกากลาง มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B ประปราย ในประเทศกัวเตมาลา และประเทศนิการากัว ในประเทศเฮติ และประเทศฮอนดูรัส มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง ในขณะที่ประเทศจาเมกา มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI ระบาดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ในประเทศคอสตาริกา พบผู้ติดเชื้อ SARI อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น
- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้** ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศเอกวาดอร์ มีรายงานสถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) อย่างต่อเนื่อง ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- **ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา** แอฟริกาตะวันตก มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในบางประเทศ ในประเทศบูร์กินาฟาโซ และประเทศโกตดิวัวร์ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และชนิด B-Victoria ประเทศโตโก มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในเดือนสิงหาคมและกันยายนสาธารณรัฐกินี มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) และตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) เช่นกัน แอฟริกากลาง ไม่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ แอฟริกาตะวันออก ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ สหสาธารณรัฐแทนซาเนียในเดือนตุลาคม ได้รับรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B

- **ประเทศเอเชียเขตร้อน** ในเอเชียใต้ ตัวบ่งชี้อาการเจ็บป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ยังคงมีรายงานการตรวจพบไข้หวัดใหญ่ชนิด B และชนิด A (H3N2) ประปราย ในประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศอินเดีย ตามลำดับ
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) อย่างต่อเนื่อง ในประเทศที่มีการรายงานในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรายงานพบผู้ป่วย ILI และ SARI ลดลง แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทย มีรายงานการตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ประปราย
- **ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้** สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับตามฤดูกาล
- ในโอเชียเนีย มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และตัวบ่งชี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น ๆ อยู่ในระดับต่ำมาก แม้ว่าจะมีการตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ อย่างต่อเนื่อง มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ RSV แพร่ระบาดในบางพื้นที่ของประเทศออสเตรเลีย
- ในแอฟริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และโรคปอดบวม จากการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ RSV เพิ่มขึ้น และมีการรายงานอยู่ในระดับต่ำเกณฑ์การแพร่ระบาด
- ในเขตอบอุ่นของอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศอาร์เจนตินา และประเทศปารากวัย พบผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_12_07_surveillance_update_382.pdf?ua=1


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 ธันวาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 118,179 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 178.25 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 823.07 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 581.37 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 352.76 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กจึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	47,465	0	283.26	0.00	0.00
เหนือ	30,765	0	247.39	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32,410	2	147.30	0.01	0.01
ใต้	7,539	1	79.97	0.01	0.01

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 283.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 247.39 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 147.30 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 79.97 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนรวมทั้งหมด 3 ราย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย และภาคใต้ 1 ราย


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พะเยา	2,228	467.91
2	เชียงใหม่	7,092	404.04
3	หนองคาย	1,961	375.67
4	ระยอง	2,591	361.23
5	กรุงเทพมหานคร	20,461	360.26

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา อัตราป่วย 467.91 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 404.04 ต่อประชากรแสนคน หนองคาย อัตราป่วย 375.67 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 361.23 ต่อประชากรแสนคน และกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 360.26 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 360.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 313.36 ต่อประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพที่ 6 อัตราป่วย 203.66 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	118179	3	66301242	178.25	0.00	0.00
ภาคเหนือ	30765	0	12436028	247.39	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่/เครือข่ายบริการที่ 1	23107	0	5878537	313.36	0.00	0.00
เชียงใหม่	12289	0	1755291	404.04	0.00	0.00
เชียงราย	3031	0	1289873	308.71	0.00	0.00
ลำปาง	2415	0	744714	273.39	0.00	0.00
ลำพูน	1675	0	405936	209.15	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	448	0	280826	142.79	0.00	0.00
น่าน	1047	0	479414	194.82	0.00	0.00
พะเยา	1561	0	476157	467.91	0.00	0.00
แพร่	641	0	446326	201.42	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/เครือข่ายบริการที่ 2	6612	0	3565071	205.47	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	1105	0	994936	165.44	0.00	0.00
พิษณุโลก	2693	0	866129	338.40	0.00	0.00
สุโขทัย	1032	0	598287	157.12	0.00	0.00
ตาก	590	0	649472	130.72	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1192	0	456247	210.19	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/เครือข่ายบริการที่ 3	7212	0	2992420	167.72	0.00	0.00
ชัยนาท	126	0	328993	48.63	0.00	0.00
กำแพงเพชร	2259	0	728470	151.69	0.00	0.00
นครสวรรค์	3742	0	1064649	252.57	0.00	0.00
พิจิตร	707	0	540620	144.09	0.00	0.00
อุทัยธานี	378	0	329688	86.75	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	47465	0	16756435	283.26	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	4938	0	5343264	92.42	0.00	0.00
อ่างทอง	433	0	281014	154.08	0.00	0.00
ลพบุรี	666	0	758003	87.86	0.00	0.00
นครนายก	199	0	259718	76.62	0.00	0.00
นนทบุรี	810	0	1238015	65.43	0.00	0.00
อยุธยา	1133	0	815647	138.91	0.00	0.00
ปทุมธานี	727	0	1137603	63.91	0.00	0.00
สระบุรี	822	0	643531	127.73	0.00	0.00
สิงห์บุรี	148	0	209733	70.57	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	9666	0	5324608	181.53	0.00	0.00
กาญจนบุรี	1903	0	890565	213.68	0.00	0.00
นครปฐม	2422	0	914273	264.91	0.00	0.00
เพชรบุรี	562	0	483335	116.28	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	780	0	546396	142.75	0.00	0.00
ราชบุรี	1229	0	872615	140.84	0.00	0.00
สมุทรสาคร	1007	0	573215	175.68	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	248	0	193847	127.94	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	1515	0	850362	178.16	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	12400	0	6088563	203.66	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	1869	0	712449	262.33	0.00	0.00
จันทบุรี	1290	0	535478	240.91	0.00	0.00
ชลบุรี	2463	0	1522285	161.80	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	847	0	489592	173.00	0.00	0.00
ระยอง	2591	0	717276	361.23	0.00	0.00
สระแก้ว	255	0	563014	45.29	0.00	0.00
สมุทรปราการ	2779	0	1318687	210.74	0.00	0.00
ตราด	306	0	229782	133.17	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32410	2	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	7026	0	5062199	138.79	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	570	0	985676	57.83	0.00	0.00
ขอนแก่น	4132	0	1805903	228.81	0.00	0.00
มหาสารคาม	1173	0	963060	121.80	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	1151	0	1307560	88.03	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	5501	0	5553738	99.05	0.00	0.00
บึงกาฬ	513	0	423485	121.14	0.00	0.00
เลย	7	0	642220	1.09	0.00	0.00
นครพนม	1016	0	718406	141.42	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	696	0	511878	135.97	0.00	0.00
หนองคาย	1961	0	521995	375.67	0.00	0.00
สกลนคร	462	0	1150876	40.14	0.00	0.00
อุดรธานี	846	0	1584878	53.38	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	12832	2	6772779	189.46	0.03	0.02
บุรีรัมย์	2851	0	1593378	178.93	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1980	0	1139067	173.83	0.00	0.00
นครราชสีมา	6947	2	2642815	262.86	0.08	0.03
สุรินทร์	1054	0	1397519	75.42	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/ เครือข่ายบริการที่ 10	7051	0	4613643	152.83	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	319	0	378363	84.31	0.00	0.00
มุกดาหาร	802	0	351532	228.14	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	921	0	1472521	62.55	0.00	0.00
อุบลราชธานี	4998	0	1872091	266.97	0.00	0.00
ยโสธร	11	0	539136	2.04	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	7539	1	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/ เครือข่ายบริการที่ 11	4935	1	4466673	110.48	0.02	0.02
ชุมพร	715	0	510307	140.11	0.00	0.00
กระบี่	475	0	471754	100.69	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	1540	0	1558958	98.78	0.00	0.00
พังงา	419	0	267866	156.42	0.00	0.00
ภูเก็ต	483	0	406113	118.93	0.00	0.00
ระนอง	98	0	191134	51.27	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	1205	1	1060541	113.62	0.09	0.08
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	2604	0	4960215	52.50	0.00	0.00
นราธิวาส	898	0	799357	112.34	0.00	0.00
ปัตตานี	97	0	713937	13.59	0.00	0.00
พัทลุง	462	0	524951	88.01	0.00	0.00
สตูล	117	0	320637	36.49	0.00	0.00
สงขลา	587	0	1428429	41.09	0.00	0.00
ตรัง	254	0	643093	39.50	0.00	0.00
ยะลา	189	0	529811	35.67	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	20461	0	5679532	360.26	0.00	0.00


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 ธันวาคม 2563 พบจำนวน 27 เหตุการณ์ ใน 20 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 9 เหตุการณ์ เรือนจำ 9 เหตุการณ์ กองร้อยอาสาสมัครสาธารณสุข 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เหตุการณ์ และค่ายบำบัดยาเสพติด 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปรายงานประจำปี