




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



เป็นข่าว



กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

กอฟฟ. จัดประชุมวิชาการ “การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์”



เมื่อวันที่ (18 มิถุนายน 2564) ที่ผ่านมา แพทย์หญิงชวินันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมวิชาการ หัวข้อ “การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์” ซึ่งจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านการเพชบุ๊กไลฟ์ ทางเพจกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค โดยมีประเด็นการพูดคุย ดังนี้ 1. การจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย โดย พญ.สุชาติดา เจียมศิริ 2. การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ และ 3. การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ายาคูมก่าเนดชนิดฮอริโมนเพศโดย ผศ.พญ.อรวิณ วัลลภการ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ สคร. สสจ. และโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวน 7,900 คน ในการเป็นผู้นำจัดบริการป้องกันเอชไอวี การตรวจหาเอชไอวี และการคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และเพศภาวะ มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่ยังเป็นอุปสรรค และการพัฒนากลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนในองค์กรที่นำโดยกลุ่มประชากรหลักและชุมชนเป็นหน่วยร่วมบริการภาคประชาสังคม

การประชุมดังกล่าว ได้หยิบยกประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยจากต่างประเทศ ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายรุนแรง หากติดเชื้อโควิด และหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อาจทำให้เสียชีวิตได้ องค์การอนามัยโลกและสถาบันต่างๆ จึงมีคำแนะนำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นกลุ่มที่สามารถเข้ารับบริการ การฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงระดับ CD4 หรือปริมาณไวรัส แต่หากผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีอาการของการติดเชื้อฉวยโอกาส ต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้ดูแลประจำเป็นผู้พิจารณาว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้หรือไม่

นอกจากนี้ทางกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จัดทำแนวทางการฉีดวัคซีนโควิดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ว่าสามารถรับบริการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เหมือนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ