


มาตรการ กำจัดโรคหัด

รายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยหัดในประเทศไทย*

46% ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

82% ผู้ป่วยไม่เคยได้รับวัคซีนหรือ
ไม่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนมาก่อน


เสียชีวิต **23** ราย



*จากฐานข้อมูลกำจัดโรคหัดออนไลน์ Measles Database Online
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 ธันวาคม 2561

ร้อยละเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อน ของโรคหัด ปี พ.ศ. 2561

การระบาดเป็นกลุ่มก้อน มักพบในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
โดยได้รับรายงานที่ระบุสถานที่ จำนวน 91 เหตุการณ์



- สถานศึกษา
- โรงพยาบาล
- บริษัท
- ค่ายทหาร/ศูนย์อพยพ/ที่พักอาศัยคนงาน
- โรงงาน
- เรือนจำ/สถานพินิจ
- ตลาด/ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า

- * ประเทศไทยให้คำมั่นสัญญากับนานาชาติในการกำจัดโรคหัดให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2563
- * เป้าหมายการกำจัดโรคหัด ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัด ไม่เกิน 1 ราย ต่อประชากรล้านคน
- * ผู้ป่วยโรคหัดแพร่กระจายเชื้อ จากการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด
- * อาการคล้ายคลึงกับไข้หวัดธรรมดา คือ มีไข้ น้ำมูกไหล ไอ บางรายมีตาแดง ถ่ายเหลว มีจุดขาว ๆ เล็ก ๆ ที่กระพุ้งแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-4 วัน จะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้น มักเริ่มจากใบหน้าบริเวณชิดขอบผม และร่างกายเมื่อผื่นขึ้นประมาณ 1-2 วัน ไข้จะเริ่มลดลง ผื่นจะจางหายไปประมาณ 2 สัปดาห์
- * บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทำให้เสียชีวิต เช่น ปอดบวม
- * ช่วงที่มีอาการป่วย ผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

**“วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ ทั้งชนิด
รับประทานและฉีด สามารถป้องกัน และลดอัตรา
การเป็นโรคโปลิโอ และโรคอื่น ๆ สามารถฉีดวัคซีนได้
โดยไม่ขัดต่อหลักศาสนา”**

คำวินิจฉัยของวุฒิสภาและองค์การระดับนานาชาติ



เป้าหมายการกำจัดโรคหัด

ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัด ไม่เกิน 1 ราย ต่อประชากรล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2563

กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการโครงการกำจัดหัด โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้



อัตราการรายงานผู้ป่วย
ไข่ออกผื่นที่ไม่ใช่หัด/
หัดเยอรมัน **มากกว่า**
หรือเท่ากับ 2 ราย
ต่อประชากรแสนคนต่อปี



มีรายงานการตรวจ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อหา
measles IgM **อย่างน้อย**
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย
ที่รายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง
(ไม่นับผู้ป่วยในกรณี
การสอบสวนโรคจากการระบาด)



มีการเก็บตรวจวิเคราะห์
สายพันธุ์ของเชื้อ
อย่างน้อยร้อยละ 80
ของเหตุการณ์การระบาด



ต้องมีการสอบสวนโรค
เฉพาะราย สำหรับผู้ป่วย
ไข่ออกผื่นหรือผู้ป่วย
สงสัยโรคหัด/หัดเยอรมัน
ภายใน 48 ชั่วโมง
อย่างน้อยร้อยละ 80



สถานการณ์โรคหัด** ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 ธันวาคม 2561



ผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยหัด
ทั้งสิ้น **6,364** ราย
อัตราป่วย **4.32** ต่อประชากรแสนคน




เสียชีวิต **23** ราย
อัตราป่วยตายร้อยละ **0.36**




ส่งตัวอย่างตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ **6,266** ราย
ผลยืนยัน **2,857** ราย


พบผู้ป่วยมากในช่วงอายุ



ประวัติการได้รับวัคซีนจากผู้ป่วย 3,761 ราย



แผนที่แสดงอัตราป่วยของโรคหัด ปี พ.ศ. 2561



**จากฐานข้อมูลกำจัดโรคหัดออนไลน์ Measles Database Online



วัคซีนป้องกันโรคหัด ใครบ้างต้องฉีด

เป็นวัคซีนชนิดฉีด ทำจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ในรูปของวัคซีนรวม MMR ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน

ใครควรได้รับการฉีดวัคซีน

กลุ่มเป้าหมาย



เด็กเล็กอายุ **9 - 12 เดือน**
ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มที่ 1



เด็กเล็กอายุ **2 ปีครึ่ง**
ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มที่ 2



กลุ่มเสี่ยง



ผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัยหัด เช่น
เรียนห้องเดียวกันหรือทำงานร่วมกัน
และยังไม่เคยได้รับวัคซีนหัด หรือไม่เคยป่วย
เป็นโรคหัดมาก่อน อาจพิจารณา**วัคซีนหัด**
โดยวัคซีนจะได้ผลป้องกันโรคค่อนข้างดี
กรณีให้**ภายใน 72 ชั่วโมง**
หลังจากสัมผัสโรค

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน X



ห้ามฉีดวัคซีน
ให้แก่หญิงตั้งครรภ์

*หมายเหตุ: หลังการได้รับวัคซีนโรคหัด
หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรคุมกำเนิด
อีกเป็นเวลา 1 เดือน



ผู้มีประวัติแพ้วัคซีนหรือ
ส่วนประกอบของวัคซีนชนิดรุนแรง



ผู้ที่ได้รับยาสเตรอยด์
เป็นเวลานาน



ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่

แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัด

ประวัติการได้รับ วัคซีน MMR/MR	การให้วัคซีนรวม MMR ในเด็ก อายุ 9 เดือน-อายุต่ำกว่า 2 ปี 6 เดือน		การให้วัคซีนรวม MMR ในเด็ก อายุ 2 ปี 6 เดือน-อายุต่ำกว่า 7 ปี			การให้วัคซีนรวม MMR/MR ในนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1		
	ไม่เคย/ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ/ ได้รับ 1 เข็ม ก่อนอายุ 9 เดือน	ได้รับ 1 เข็ม หลังอายุ 9 เดือน	ไม่เคย/ ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ/	ได้รับ 1 เข็ม	ได้รับ 2 เข็ม	ไม่เคย/ ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ/	ได้รับ 1 เข็ม	ได้รับ 2 เข็ม
การให้วัคซีน	ให้ 1 เข็มแล้ว ติดตามฉีดเข็มที่ 2 ตามกำหนดปกติ ระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน	ไม่ต้องให้ครั้งนี้ ให้ติดตามฉีดเข็มที่ 2 ตามกำหนดปกติ ระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน	ให้ 1 เข็ม แล้วติดตาม ฉีดเข็มที่ 2 เมื่อเด็ก เข้าเรียน ชั้นป.1	ให้ 1 เข็ม ห่างจาก เข็มแรก อย่างน้อย 1 เดือน	ไม่ต้องให้	ให้ 1 เข็ม	ให้ 1 เข็ม ห่างจาก เข็มแรก อย่างน้อย 1 เดือน	ไม่ต้องให้

ร่วมกันทำ ป้องกันได้



ประชาชน

- * ผู้ปกครองควรนำบุตรหลานของท่านไปรับวัคซีนหัด
เข็มแรก อายุ 9-12 เดือน และเข็มที่สอง อายุ 2 ปีครึ่ง
สามารถรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- * หากท่านหรือญาติมีอาการป่วยที่สงสัยว่าเป็นหัด
ควรรีบไปพบแพทย์



ผู้ป่วย

- * ควรหยุดเรียนหรือหยุดงานจนถึง 4 วัน
หลังจากมีผื่นขึ้น หากจำเป็นต้องออกไป
ในที่ชุมชนควรสวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้ง



หน่วยงานสาธารณสุข



- * เจ้าหน้าที่ระดับวิทยาดำเนินการสอบสวนผู้ป่วยที่มีอาการไข่ออกผื่นหรือสงสัยหัด/หัดเยอรมัน ภายใน 48 ชั่วโมง
หลังจากพบผู้ป่วย
- * เก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ดังนี้ ตรวจเลือด: ระยะเวลาที่เหมาะสมที่ควรเก็บ คือ 4-30 วัน
หลังพบผื่น และตรวจ Throat swab / Nasal swab 4-5 วัน หลังพบผื่น
- * เพิ่มความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง และสอบสวนผู้ป่วยไข่ออกผื่นทุกราย รวมถึงเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบ Measles Database Online (www.eradicationthai.com) ภายใน 48 ชม. หลังพบผู้ป่วยสงสัย
- * หากพบเหตุการณ์การระบาดแบบกลุ่มก้อน ให้ทำการสอบสวนโรค และแจ้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ของจังหวัด
เฝ้าระวังผู้ป่วยในเหตุการณ์อย่างน้อย 42 วันหรือ 6 สัปดาห์ หลังจากพบผู้ป่วยรายสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่า
การระบาดสงบ
- * ตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ทั้ง 2 เข็ม ในกลุ่มเป้าหมาย
โดยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
- * รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้วัคซีนโรคหัดในกลุ่มเป้าหมาย



สายด่วนกรมควบคุมโรค
1422



DDC WATCH
ACCESS ONLINE QR CODE

ที่ปรึกษา อัมภางค์ รวยอาจิน นคร เปรมศรี
ผู้เขียน ชาณัฐ เอื้อกุล, ฤทธิชัย ใจผ่อง, ศรีญา ไซยา, ภาวินี ด่วงเงิน สำนักระบาดวิทยา
กองบรรณาธิการ สิริลักษณ์ รังษีวงศ์, บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, ณฐวดี ศรีวรรณยศ, นันทน์ รุ่งเลื่อน
ออกแบบ ชญาบุญ บุญสิริวรรณ, นันทน์ รุ่งเลื่อน
จำนวน 1,000 ฉบับ
จัดทำโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 3805

เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักระบาดวิทยา : <https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/boe> สำนักระบาดวิทยา