

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำปี 14 - 20 พ.ย. 2567

เหตุการณ์อื่น ๆ

ที่สำคัญประจำปี 14

- 14 พฤศจิกายน 2567 กรมควบคุมโรค ได้รับข่าวเบื้องต้นจากเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศในการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N1 และ H9 ในสัตว์ปีก ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว ซึ่งได้มีการตรวจสอบข่าวยืนยันการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่ สปป. ลาว จริง โดยพื้นที่ดังกล่าวติดต่อกับ อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย ประเทศไทย ซึ่งไทยได้มีการเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว โดยมี การเฝ้าระวังเชิงรุกในสัตว์ปีกซึ่งมี การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และขยายผลการเฝ้าระวังไปยังนกป่า ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ. เชียงรายและศูนย์วิจัย และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน จ. ลำปาง มีความพร้อมในการตรวจเชื้อ H5N1 และ H9 ของตัวอย่างในคน และในสัตว์ ทั้งนี้หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ของไทยได้มีการซ้อมแผนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยผ่านความร่วมมือ ไทย - ลาว ในการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนกเป็นประจำ และต่อเนื่อง อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกัน จัดทำแผนงานเพื่อเตรียมรับมือ กับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตามแนวชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มาตั้งแต่ ปี 2557
- 15 - 16 พฤศจิกายน 2567 ผู้แทนจาก กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม เรื่องการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย มีผู้นำและผู้บริหารระดับสูง กว่า 65 ประเทศ รวมทั้งองค์กร ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปโดยสังเขปที่ประชุมมีความเห็น ร่วมกันในการเร่งรัดดำเนินการเพื่อควบคุม การดื้อยาต้านจุลชีพ โดยให้ความสำคัญ กับการเสริมสร้างกลไกธรรมาภิบาล ในการบริหารกำกับกำกับการดำเนินงานตามแผน จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ การเฝ้าระวัง เชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ การศึกษาวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงยา ต้านจุลชีพและทางเลือกในการแก้ปัญหา เชื้อดื้อยา โดยมีเป้าหมายให้ทั่วโลกลดการ เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ให้ได้ ร้อยละ 10 ในปี 2573

“ โรคไทรน ” โรคร้ายในเด็กที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

สถานการณ์โรคไทรนในประเทศไทย ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 16 พฤศจิกายน 2567 พบว่ามีกรายงานผู้ป่วยสงสัยไทรน 1,186 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบมาก 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส

โรคไทรนนับเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมีระยะฟักตัว ประมาณ 7 - 10 วัน แต่บางครั้งอาจนานถึง 20 วัน โดยเชื่อกันว่าทำให้เยื่อทางเดินหายใจอักเสบเกิดอาการไอ โดยในระยะแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัด คือ ไอและมีน้ำมูกเล็กน้อย อาจไม่มีไข้หรือมีไข้ต่ำ ๆ สิ่งที่ต่างไปจากไข้หวัด คือ อาการไอจะมากขึ้นแต่ปริมาณน้ำมูก ยังคงเดิมกล่าวคือน้ำมูกไม่ได้มากขึ้นตามอาการไอ อาการที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้ คือ ไอเป็นชุด ๆ ไอติด ๆ กัน 5 - 10 ครั้ง นานประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายมีอาการไอมากจนหายใจไม่ทันและมีอาการหายใจเข้าลึก ๆ เป็นเสียงวี๊ด สลับกับการไอเป็นชุด บางรายไอจนตาแดง อาการไอเป็นชุดจะลดลงทั้งความรุนแรงและจำนวนครั้งของอาการไอ ระยะเวลาการดำเนินโรคถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนจะใช้เวลาประมาณ 6 - 10 สัปดาห์

โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จึงขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดที่ปรากฏในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กให้ครบตามช่วงวัย สำหรับ แรงงานข้ามชาติที่นำครอบครัวและบุตรหลานเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามระเบียบเรื่อง การประกันสุขภาพในแรงงานข้ามชาติ ปี 2563 หากมีบุตรหลานที่อายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้ในอัตรา 365 บาทต่อคน เฉลี่ยวันละ 1 บาท มีอายุคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อบัตรซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน เหมือนเด็กไทยและสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนพื้นฐานอย่างต่อเนื่องได้ในสถานบริการ สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เพื่อให้บุตรหลานปลอดภัยจากโรคทุกโรคที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท. แจ่ง อสต. และ จนท. สาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ความรู้ เรื่องโรคไทรนและโรคอื่น ๆ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยให้ทราบถึงสาเหตุ การเกิดโรค อาการ ช่องทางการติดต่อ รวมทั้งวิธีป้องกันโรคดังกล่าวแก่ลูกบ้าน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กในปกครอง ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดการรณรงค์ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการนำบุตรหลานมารับการ ฉีดวัคซีน โดยวัคซีนป้องกันโรคไทรนสำหรับเด็กเล็กควรได้รับวัคซีน DTP อย่างน้อย 3 เข็ม และควรแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันไทรนด้วย เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าวในระดับหนึ่ง รวมทั้งควรให้ คำแนะนำในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในพื้นที่เรื่องการซื้อบัตรประกันสุขภาพเพื่อให้ สามารถนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องจนครบตามเกณฑ์ได้ในสถานบริการ สาธารณสุขใกล้บ้าน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรครวมทั้งยังสามารถลดความรุนแรง และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ
oic.ddc@gmail.com
02-5903832
www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

- <https://www.bangkokbiznews.com/health/public-health/1153366>
- <https://www.hfocus.org/content/2024/11/32222>
- <https://ddc.moph.go.th/odpc12/news.php?news=40565&deptcode=odpc12>
- <https://www.pidst.or.th/A299.html>
- ขอบคุณข้อมูลจาก : การจัดทำโดย สพ.ญ.ดร.เสาวพัทธ์ อั้นจ้อย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 15 พย 2567
- ขอบคุณข้อมูลจาก : รายงานสถานการณ์โรคไอกรน (Pertussis) กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ขอบคุณภาพจาก: <https://www.gedgoodlife.com/health/1299-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99/>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://medthai.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99/>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99>