

“ รู้ก่อนป้องกันได้ ”

ไวรัสสเมาร์บวาร์ก
19 และ 13 โรคติดต่ออันตราย
ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568



โรคมาส์บอร์ก

เป็นโรคติดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง
ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคนี้มาก่อน

อย่างไรก็ดี หากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

และมีอาการคล้ายโรคมาส์บอร์ก

แนะนำให้ไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

ไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดอยู่ในปัจจุบัน

เช่น ประเทศแถบแอฟริกา



อาการ

เมื่อเชื้อไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกาย



ปวดศีรษะ




อาเจียน



อาเจียนเป็นเลือด



ปวดท้อง ท้องร่วง



ถ่ายสีดำ



ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ



มีไข้สูง



ซึม



ผื่นนูนแดง ตามร่างกาย



เลือดออกตา



โรคติดเชื้อไวรัสซาร์บอร์ก
มีระยะฟักตัวตั้งแต่ 2 - 21 วัน
หลังจากสัมผัสสารคัดหลั่ง
ของผู้ติดเชื้อ หรือสัตว์นำโรค

หากมีภาวะ
เลือดออก
รุนแรงจะทำให้...
เกิดภาวะช็อก และเสียชีวิตได้
ผู้ป่วยอาการรุนแรงมักเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 8-9 วันหลังจากมีอาการ

ที่มา : กองระบาดวิทยา





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สาเหตุเกิดจาก

การสัมผัสต่างดาวพลั่ว
ในเหมืองหรือท่า เมื่อโรคแพร่
จากสัตว์สู่คนแล้ว...

ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่โรคต่อไปสู่ผู้อื่น
ผ่านการสัมผัส สารคัดหลั่งของผู้ป่วย

เช่น เลือด อาเจียน น้ำลาย

สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน เจ็มฉีดยา เป็นต้น





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การป้องกัน

1

ผู้ที่เดินทางไปประเทศแถบแอฟริกา หรือประเทศที่กำลังมีการระบาด
ในหลักเสี่ยง การสัมผัสกับสัตว์รังโรค ควรล้างมือด้วยสบู่หลังสัมผัสสัตว์
เนื้อสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้มีอาการป่วย
สารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือผู้สงสัยติดเชื้อโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน

2

สถานพยาบาลที่มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง
ในผู้ป่วย ในผู้มีประวัติการเดินทางมาจากประเทศที่พบการระบาด
และพิจารณาส่งตรวจหาเชื้อเมื่อผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยง

3

หากผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคมีอาการสงสัย
ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

#ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และไม่มียารักษาจำเพาะ

ที่มา: กองระบาดวิทยา

